

癫痫发作急救

强直阵挛性发作

强直阵挛性发作时，患者身体僵硬（强直），之后全身肌肉会突然抽动（阵挛）。



确保：

- ✓ 与患者待在一起
- ✓ 记录发作持续时间
- ✓ 让患者远离危险：不让他们受伤，尤其是头部
- ✓ 肌肉抽动结束之后帮患者翻身侧卧（如果口中有食物、液体或呕吐物，应立即行动）
- ✓ 观察并监测患者呼吸
- ✓ 温和安抚患者直至恢复

不要

- ✗ 置任何东西于患者口中
- ✗ 束缚患者全身抽动
- ✗ 移动患者，有危险的情况除外


局灶性发作

局灶性发作是一种非惊厥性抽搐，可能伴有明显的迷惑、不恰当的应答或行为。

- 与患者待在一起
- 记录发作发作时间
- 温和引导患者远离危险
- 安抚患者直至恢复
- 不要束缚患者的发作，有危险的情况除外

以下情况请拨打 000 呼叫救护车：

- 你不确定
- 患者已经受伤
- 口中有食物、液体或呕吐物
- 患者在水中癫痫发作
- 全身抽动结束之后患者出现呼吸困难
- 发作之后紧接着又发生了第二次
- 发作持续时间超过5分钟
- 抽搐发作结束5分钟以后，患者仍没有反应



此情况说明书不应作为癫痫发作的医疗建议，也没有包括应对癫痫发作的所有方案，而仅仅是癫痫发作应对方案指南。如果你不确定该如何做，请呼叫救护车。

由 NSW Government Stronger Communities Fund Community Grants Program and Cumberland Council 资助，并深感自豪。

更多有关癫痫的信息或建议，请拨打 1300 37 45 37 联系 Epilepsy Action Australia，或访问网站 www.epilepsy.org.au



Epilepsy
Action
Australia